



# 隐函数的求导

---

徐海峰整理

November 4, 2025

数学科学学院, 扬州大学

此幻灯片的教学内容面向非数学专业的理工科本科生.

内容基于下面的教材:

蒋国强、蔡蕃、张兴龙、汤进龙、孟国明、俞皓等编《高等数学》.

---

部分内容参考自以下参考文献.

[1] 梅加强编著《数学分析》，高等教育出版社.

# 隐函数求导

---

由二元方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数称为**隐函数**. 隐函数的求导基于**隐函数存在定理**. (这里我们总是假设在一定条件下, 隐函数是存在的. 即承认这个定理.)

由二元方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数称为**隐函数**. 隐函数的求导基于**隐函数存在定理**. (这里我们总是假设在一定条件下, 隐函数是存在的. 即承认这个定理.)

假设由方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数为  $y = y(x)$ , 将其代入方程即得关于  $x$  的一元方程  $F(x, y(x)) = 0$ , 从而可以求导(如果可以求的话).

由二元方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数称为 **隐函数**. 隐函数的求导基于 **隐函数存在定理**. (这里我们总是假设在一定条件下, 隐函数是存在的. 即承认这个定理.)

假设由方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数为  $y = y(x)$ , 将其代入方程即得关于  $x$  的一元方程  $F(x, y(x)) = 0$ , 从而可以求导(如果可以求的话).

**例**

求由方程  $x^2 + y^2 = a^2$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx}$ .

由二元方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数称为 **隐函数**. 隐函数的求导基于 **隐函数存在定理**. (这里我们总是假设在一定条件下, 隐函数是存在的. 即承认这个定理.)

假设由方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数为  $y = y(x)$ , 将其代入方程即得关于  $x$  的一元方程  $F(x, y(x)) = 0$ , 从而可以求导(如果可以求的话).

**例**

求由方程  $x^2 + y^2 = a^2$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx}$ .

**解.** 方程两边同时对  $x$  求导, 注意  $y$  是  $x$  的函数.

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0,$$

由二元方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数称为 **隐函数**. 隐函数的求导基于 **隐函数存在定理**. (这里我们总是假设在一定条件下, 隐函数是存在的. 即承认这个定理.)

假设由方程  $F(x, y) = 0$  所确定的函数为  $y = y(x)$ , 将其代入方程即得关于  $x$  的一元方程  $F(x, y(x)) = 0$ , 从而可以求导(如果可以求的话).

**例**

求由方程  $x^2 + y^2 = a^2$  所确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx}$ .

**解.** 方程两边同时对  $x$  求导, 注意  $y$  是  $x$  的函数.

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0,$$

这推出  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ .

## 例

设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^y + xy^2 - e^2 = 0$  确定, 求  $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ .

## 例

设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^y + xy^2 - e^2 = 0$  确定, 求  $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ .

解. 方程两边同时对  $x$  求导,  $y$  是  $x$  的函数.

$$e^y \frac{dy}{dx} + y^2 + x \cdot 2y \frac{dy}{dx} = 0.$$

## 例

设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^y + xy^2 - e^2 = 0$  确定, 求  $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ .

解. 方程两边同时对  $x$  求导,  $y$  是  $x$  的函数.

$$e^y \frac{dy}{dx} + y^2 + x \cdot 2y \frac{dy}{dx} = 0.$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2}{2xy + e^y}.$$

## 例

设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^y + xy^2 - e^2 = 0$  确定, 求  $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ .

解. 方程两边同时对  $x$  求导,  $y$  是  $x$  的函数.

$$e^y \frac{dy}{dx} + y^2 + x \cdot 2y \frac{dy}{dx} = 0.$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2}{2xy + e^y}.$$

原方程中令  $x = 0$ , 得  $e^y - e^2 = 0$ , 故  $y = 2$ . 因此

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = -\frac{y^2}{2xy + e^y} \Big|_{x=0} = -\frac{4}{e^2}$$



## 例

求由方程  $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$  所确定的隐函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

## 例

求由方程  $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$  所确定的隐函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

解. 原方程可改写为

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}.$$

## 例

求由方程  $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$  所确定的隐函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

解. 原方程可改写为

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}.$$

两边对  $x$  求导,  $y$  视为  $x$  的函数, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{2x + 2yy'}{x^2 + y^2} &= \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \left(\frac{y}{x}\right)'_x \\ \Rightarrow \frac{x + yy'}{x^2 + y^2} &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{y'x - y}{x^2} \\ \Rightarrow x + yy' &= y'x - y, \end{aligned}$$

## 例

求由方程  $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$  所确定的隐函数的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

解. 原方程可改写为

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}.$$

两边对  $x$  求导,  $y$  视为  $x$  的函数, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{2x + 2yy'}{x^2 + y^2} &= \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \left(\frac{y}{x}\right)'_x \\ \Rightarrow \frac{x + yy'}{x^2 + y^2} &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{y'x - y}{x^2} \\ \Rightarrow x + yy' &= y'x - y, \end{aligned}$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{x + y}{x - y}.$$

解. 上式两边再对  $x$  求导,  $y$  视为  $x$  的函数, 得

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} = y'' &= \frac{(1+y')(x-y)-(x+y)(1-y')}{(x-y)^2} \\ &= \frac{(x-y+xy'-yy')-(x+y-xy'-yy')}{(x-y)^2} \\ &= \frac{2(xy'-y)}{(x-y)^2} \\ &= \frac{2\left(x\frac{x+y}{x-y}-y\right)}{(x-y)^2} \\ &= \frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}.\end{aligned}$$



# 隐函数定理

---

## 隐函数定理

---

隐函数定理是一个非常重要的定理. 推广到高维时被称为**隐映射定理**.

## 隐函数定理

---

隐函数定理是一个非常重要的定理. 推广到高维时被称为**隐映射定理**. 在讲隐函数定理前, 必须先介绍二元函数的偏导数.

## 由参数方程所确定的函数的求导法则

---

# 参数方程所确定的函数

## 定义

如果参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad t \in I \quad (*)$$

确定了  $y$  与  $x$  之间的对应关系可以表示为  $y$  关于  $x$  的一个函数, 则称此函数  $y = y(x)$  是由此参数方程所确定的函数.

# 参数方程所确定的函数

## 定义

如果参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad t \in I \quad (*)$$

确定了  $y$  与  $x$  之间的对应关系可以表示为  $y$  关于  $x$  的一个函数, 则称此函数  $y = y(x)$  是由此参数方程所确定的函数.

当然, 若确定的是  $x$  关于  $y$  的函数关系, 则称  $x = x(y)$  是由此参数方程所确定的函数.

## 命题

设  $y = y(x)$  是由参数方程 (\*) 所确定的的函数,  $x = \varphi(t)$  在  $t_0$  附近有反函数  $t = \varphi^{-1}(x)$ . 设  $\varphi(t)$  和  $\psi(t)$  在  $t_0$  处可导, 且  $\varphi'(t_0) \neq 0$ . 则  $y = y(x)$  在  $x_0 = \varphi(t_0)$  处可导, 且

$$\frac{dy}{dx}(x_0) = y'(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

## 命题

设  $y = y(x)$  是由参数方程 (\*) 所确定的的函数,  $x = \varphi(t)$  在  $t_0$  附近有反函数  $t = \varphi^{-1}(x)$ . 设  $\varphi(t)$  和  $\psi(t)$  在  $t_0$  处可导, 且  $\varphi'(t_0) \neq 0$ . 则  $y = y(x)$  在  $x_0 = \varphi(t_0)$  处可导, 且

$$\frac{dy}{dx}(x_0) = y'(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

## Proof.

$y = y(x)$  可看作是由函数  $y = \psi(t)$  和  $t = \varphi^{-1}(x)$  复合而成的函数  $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ .

## 命题

设  $y = y(x)$  是由参数方程 (\*) 所确定的的函数,  $x = \varphi(t)$  在  $t_0$  附近有反函数  $t = \varphi^{-1}(x)$ . 设  $\varphi(t)$  和  $\psi(t)$  在  $t_0$  处可导, 且  $\varphi'(t_0) \neq 0$ . 则  $y = y(x)$  在  $x_0 = \varphi(t_0)$  处可导, 且

$$\frac{dy}{dx}(x_0) = y'(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

## Proof.

$y = y(x)$  可看作是由函数  $y = \psi(t)$  和  $t = \varphi^{-1}(x)$  复合而成的函数  $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ . 则由复合函数的求导法则

$$y'(x_0) = \frac{d\psi}{dt}(t_0) \cdot \frac{dt}{dx}(x_0) = \frac{d\psi}{dt}(t_0) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}(t_0)} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

□

若  $\varphi(t), \psi(t)$  在区间  $I$  上都可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ , 则  $y = y(x)$  在每一点  $x$  处可导. 可以简写为

$$y'_x = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad t \in I.$$

若  $\varphi(t), \psi(t)$  在区间  $I$  上都可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ , 则  $y = y(x)$  在每一点  $x$  处可导. 可以简写为

$$y'_x = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad t \in I.$$

### 命题

如果  $x = \varphi(t)$  和  $y = \psi(t)$  是定义在  $t_0$  附近的可微函数, 并且在  $t_0$  处二阶可导,  $\varphi'(t)$  在  $t_0$  附近非零, 则  $y = y(x)$  在  $x_0 = \varphi(t_0)$  处二阶可导, 且

$$\frac{d^2y}{dx^2}(x_0) = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)\bigg|_{x=x_0} = \frac{\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{[\varphi'(t)]^3}\bigg|_{t_0}.$$

## Proof.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{y'(x) - y'(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} - \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}}{x - x_0} \\ &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\psi'(t)\varphi'(t_0) - \psi'(t_0)\varphi'(t)}{\varphi'(t)\varphi'(t_0)(t - t_0)} \cdot \frac{t - t_0}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\varphi'(t)\varphi'(t_0)} \left[ \frac{\psi'(t) - \psi'(t_0)}{t - t_0} \varphi'(t_0) - \frac{\varphi'(t) - \varphi'(t_0)}{t - t_0} \psi'(t_0) \right] \cdot \frac{1}{\frac{x - x_0}{t - t_0}} \\ &= \frac{1}{[\varphi'(t_0)]^2} \left[ \psi''(t_0)\varphi'(t_0) - \varphi''(t_0)\psi'(t_0) \right] \cdot \frac{1}{\varphi'(t_0)} \\ &= \frac{\psi''(t_0)\varphi'(t_0) - \varphi''(t_0)\psi'(t_0)}{[\varphi'(t_0)]^3}. \end{aligned}$$

□

**Proof.**

或者应用前面  $\frac{\psi}{\varphi}$  的求导法则. 若  $\psi, \varphi$  在  $t_0$  处可导, 且  $\varphi'(t_0) \neq 0$ , 则  $\frac{\psi}{\varphi}$  在  $t_0$  处也可导.

## Proof.

或者应用前面  $\frac{\psi}{\varphi}$  的求导法则. 若  $\psi, \varphi$  在  $t_0$  处可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ , 则  $\frac{\psi}{\varphi}$  在  $t_0$  处也可导. 为简略, 以下将  $t_0$  写为  $t$ .

## Proof.

或者应用前面  $\frac{\psi}{\varphi}$  的求导法则. 若  $\psi, \varphi$  在  $t_0$  处可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ , 则  $\frac{\psi}{\varphi}$  在  $t_0$  处也可导. 为简略, 以下将  $t_0$  写为  $t$ .

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right] \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{[\varphi'(t)]^3}\end{aligned}$$

## Proof.

或者应用前面  $\frac{\psi}{\varphi}$  的求导法则. 若  $\psi, \varphi$  在  $t_0$  处可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ , 则  $\frac{\psi}{\varphi}$  在  $t_0$  处也可导. 为简略, 以下将  $t_0$  写为  $t$ .

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right] \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{[\varphi'(t)]^3}\end{aligned}$$

但是这样做得加强条件:  $\varphi(t)$  和  $\psi(t)$  在  $t_0$  附近二阶可导. □

欢迎访问 [atzjg.net](http://atzjg.net)