



微分中值定理的应用

徐海峰整理

November 11, 2025

数学科学学院, 扬州大学

此幻灯片的教学内容面向非数学专业的理工科本科生.

内容基于下面的教材:

梅加强编著《数学分析》，高等教育出版社.

其他参考文献.

[1] 蒋国强、蔡蕃、张兴龙、汤进龙、孟国明、俞皓等编《高等数学》.

单调函数

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微. 如果 $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$, 则 f 为常数.

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微. 如果 $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$, 则 f 为常数.

Proof.

任取 $x, y \in [a, b]$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y) = 0,$$

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微. 如果 $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$, 则 f 为常数.

Proof.

任取 $x, y \in [a, b]$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y) = 0,$$

因此 f 为常值函数.

□

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 则 f 为单调函数当且仅当 f' 不变号.

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 则 f 为单调函数当且仅当 f' 不变号.

Proof.

不妨设 f 是单调递增函数,

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 则 f 为单调函数当且仅当 f' 不变号.

Proof.

不妨设 f 是单调递增函数, 则 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时始终非负.

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 则 f 为单调函数当且仅当 f' 不变号.

Proof.

不妨设 f 是单调递增函数, 则 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时始终非负. 因此当 $x_0 \in (a, b)$ 时,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geqslant 0.$$

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 则 f 为单调函数当且仅当 f' 不变号.

Proof.

不妨设 f 是单调递增函数, 则 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时始终非负. 因此当 $x_0 \in (a, b)$ 时,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geqslant 0.$$

反之, 不妨设 $f'(x) \geqslant 0, \forall x \in (a, b)$.

命题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 则 f 为单调函数当且仅当 f' 不变号.

Proof.

不妨设 f 是单调递增函数, 则 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时始终非负. 因此当 $x_0 \in (a, b)$ 时,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

反之, 不妨设 $f'(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$. 任取 $x_1 < x_2 \in [a, b]$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0,$$

因此 f 是单调递增的. □

注

若恒有 $f' > 0$, 则 f 严格单调递增;

注

若恒有 $f' > 0$, 则 f 严格单调递增; 若恒有 $f' < 0$, 则 f 严格单调递减.

注

若恒有 $f' > 0$, 则 f 严格单调递增; 若恒有 $f' < 0$, 则 f 严格单调递减.

但反之不然, 例如 $f(x) = x^3$ 严格单调递增, 但 $f'(0) = 0$.

反函数定理

首先回顾一下 `Calculus_chap1-8.pdf` 中讲到的关于单调函数的一个命题.

命题

设 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的连续函数, 则 f 可逆当且仅当 f 是严格单调函数.

首先回顾一下 `Calculus_chap1-8.pdf` 中讲到的关于单调函数的一个命题.

命题

设 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的连续函数, 则 f 可逆当且仅当 f 是严格单调函数.

(见[Mei] 书P.88, 推论 3.4.7.)

定理

设 f 为区间 I 上的可微函数, 如果 f 的导数处处非零, 则 $f : I \rightarrow f(I)$ 是可逆的, 且其逆函数也可微.

定理

设 f 为区间 I 上的可微函数, 如果 f 的导数处处非零, 则 $f : I \rightarrow f(I)$ 是可逆的, 且其逆函数也可微.

Proof.

任取 $x_1 < x_2 \in I$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

定理

设 f 为区间 I 上的可微函数, 如果 f 的导数处处非零, 则 $f : I \rightarrow f(I)$ 是可逆的, 且其逆函数也可微.

Proof.

任取 $x_1 < x_2 \in I$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

由于 $f'(\xi) \neq 0$, 故 $f(x_2) \neq f(x_1)$. 因此 f 是单射. 故 $f : I \rightarrow f(I)$ 是可逆的.

定理

设 f 为区间 I 上的可微函数, 如果 f 的导数处处非零, 则 $f : I \rightarrow f(I)$ 是可逆的, 且其逆函数也可微.

Proof.

任取 $x_1 < x_2 \in I$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

由于 $f'(\xi) \neq 0$, 故 $f(x_2) \neq f(x_1)$. 因此 f 是单射. 故 $f : I \rightarrow f(I)$ 是可逆的. 由于定义在区间上的连续函数可逆当且仅当严格单调, 因此 f 是严格单调函数. 再由反函数求导法则([Mei]命题4.1.6)知 f 的逆函数也可微. \square

极值点的判定

命题

设 $\delta > 0$, f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内连续, 在 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 内可微. 如果

$$f'(x) \leq 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0); \quad f'(x) \geq 0, \quad x \in (x_0, x_0 + \delta),$$

则 x_0 为 f 的极小值点;

极值点的判定

命题

设 $\delta > 0$, f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内连续, 在 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 内可微. 如果

$$f'(x) \leq 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0); \quad f'(x) \geq 0, \quad x \in (x_0, x_0 + \delta),$$

则 x_0 为 f 的极小值点; 如果

$$f'(x) \geq 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0); \quad f'(x) \leq 0, \quad x \in (x_0, x_0 + \delta),$$

则 x_0 为 f 的极大值点.

命题

设 f 在内点 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 则

- 如果 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 为 f 的 (严格) 极小值点;

命题

设 f 在内点 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 则

- 如果 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 为 f 的 (严格) 极小值点;
- 如果 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 为 f 的 (严格) 极大值点.

例

设 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, 证明

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

例

设 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, 证明

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

Proof.

考虑函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$, $x > -1$. 则 $f(0) = 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x},$$

当 $-1 < x < 0$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时 $f'(x) < 0$.

例

设 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, 证明

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

Proof.

考虑函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$, $x > -1$. 则 $f(0) = 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x},$$

当 $-1 < x < 0$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $x > 0$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x) \leq f(0) = 0$, $\forall x > -1$,
且等号仅在 $x = 0$ 处成立. □

Proof.

类似地, 考虑 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2},$$

Proof.

类似地, 考虑 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2},$$

当 $-1 < x < 0$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$.

Proof.

类似地, 考虑 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2},$$

当 $-1 < x < 0$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$. 因此 $g(x) \geq g(0) = 0$, 且等号仅在 $x = 0$ 处成立. □

例

证明: 当 $x > 0$ 时,

$$e^{\frac{x}{1+x}} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e.$$

例

证明: 当 $x > 0$ 时,

$$e^{\frac{x}{1+x}} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e.$$

Proof.

取对数后不等式等价于

$$\frac{x}{1+x} < x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < 1.$$

例

证明: 当 $x > 0$ 时,

$$e^{\frac{x}{1+x}} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e.$$

Proof.

取对数后不等式等价于

$$\frac{x}{1+x} < x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < 1.$$

这等价于

$$\frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$$

□

例

设 $b > a > 1$, 证明 $ba^b > ab^a$.

例

设 $b > a > 1$, 证明 $ba^b > ab^a$.

Proof.

在欲证不等式两边取对数, 得

$$\ln b + b \ln a > \ln a + a \ln b \Leftrightarrow \frac{\ln a}{a-1} > \frac{\ln b}{b-1}.$$

例

设 $b > a > 1$, 证明 $ba^b > ab^a$.

Proof.

在欲证不等式两边取对数, 得

$$\ln b + b \ln a > \ln a + a \ln b \Leftrightarrow \frac{\ln a}{a-1} > \frac{\ln b}{b-1}.$$

考虑函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$ ($x > 1$).

例

设 $b > a > 1$, 证明 $ba^b > ab^a$.

Proof.

在欲证不等式两边取对数, 得

$$\ln b + b \ln a > \ln a + a \ln b \Leftrightarrow \frac{\ln a}{a-1} > \frac{\ln b}{b-1}.$$

考虑函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$ ($x > 1$). 求导

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln x}{(x-1)^2} = \frac{(x-1) - x \ln x}{x(x-1)^2}.$$

由于

$$\frac{x-1}{1+(x-1)} < \ln(1+(x-1)), \quad \forall x > 1,$$

故 $f'(x) < 0, \forall x > 1$.

例

设 $b > a > 1$, 证明 $ba^b > ab^a$.

Proof.

在欲证不等式两边取对数, 得

$$\ln b + b \ln a > \ln a + a \ln b \Leftrightarrow \frac{\ln a}{a-1} > \frac{\ln b}{b-1}.$$

考虑函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$ ($x > 1$). 求导

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln x}{(x-1)^2} = \frac{(x-1) - x \ln x}{x(x-1)^2}.$$

由于

$$\frac{x-1}{1+(x-1)} < \ln(1+(x-1)), \quad \forall x > 1,$$

故 $f'(x) < 0, \forall x > 1$. 即 f 在 $(1, +\infty)$ 上严格单调递减. 证毕. □

习题

习题

证明下列不等式：

$$\tan x > x + \frac{x^3}{3}, \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

欢迎访问 atzjg.net